

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrożki środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.



Batalion^{450 SC}

**WYGRANA BATALIA
O ZDROWIE TWOICH JABŁEK**



SKUTECZNY FUNGICYD W SADACH



Batalion^{450 SC}

SKUTECZNY FUNGICYD W SADACH

- ☞ znana i sprawdzona substancja aktywna – pirymetanil**
- ☞ skuteczność już w dawce 0,7 l**
- ☞ łatwo rozpuszczalna płynna formacja**
- ☞ wysoka odporność na zmywanie przez opady**
- ☞ długie działanie interwencyjne, do 72 h po infekcji**
- ☞ bardzo wysoka skuteczność działania, również w niskich temperaturach**

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.

Preparat o działaniu kontaktowym i wgłębnym stosowany w ochronie jabłoni przed parchem.

Środek zawiera znaną i sprawdzoną substancję aktywną pirymetanil, która wykazuje **bardzo wysoką skuteczność w działaniu interwencyjnym**.

Substancja czynna **pirymetanil** należy do grupy związków anilinopirymidynowych.

Ze względu na **wysoką skuteczność w niskich temperaturach**, Batalion 450 SC polecany jest do wczesnowiosennych zabiegów grzybobójczych od początku wegetacji do końca kwitnienia.



ZASTOSOWANIE

- Środek o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w dawce 0,7–1,0 l/ha.
- Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą.
- Nie należy przekraczać liczby 3 zabiegów w sezonie.
- Formulacja płynna – stężona zawiesina, przeznaczona do rozcieńczania wodą.
- **Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:** 0,7–1,0 l/ha.
- **Działanie interwencyjne:** do 72 godzin po infekcji.
- **Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:** 3.
- **Zalecana ilość wody do zabiegu:** 500–750 l/ha.
- **Okres karencji:** jabłoń 28 dni.



www.batalion.info.pl