

# SOLIDER

ZAWIERA TRIFLUSULFURON METYLOWY

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.



Zwalcza chwasty, gdy inne produkty nie potrafią!

# HERBICYD

do stosowania  
w uprawie buraka cukrowego



- ✔ przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów w uprawie buraka cukrowego
- ✔ herbicyd pobierany przez liście chwastów i szybko przemieszczany w roślinie
- ✔ wykazuje bardzo wysoką skuteczność w zwalczaniu chwastów dwuliściennych
- ✔ idealne rozwiązanie przy występujących samosiewach rzepaku
- ✔ jedyny na rynku produkt o tym składzie w formułacji płynnej

Zawiera TRIFLUSULFURON METYLOWY

# SOLIDER

## ↓ DZIAŁANIE

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczenia z wodą (OD). Środek należy do grupy inhibitorów działania enzymu - syntazy acetomleczanowej (ALS), co powoduje blokowanie biosyntezy aminokwasów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania roślin. Pierwszym symptomem jego działania jest hamowanie podziału komórek w stożkach wzrostu pędów i korzeni, co wywołuje wstrzymanie wzrostu i rozwoju chwastów. Objawy działania takie jak: przejaśnienia, żółknięcie, nekrozy, a dalej brązowienie liści wrażliwych chwastów występują w ciągu kilku dni od zastosowania środka.

Ciepło i odpowiednia ilość wilgoci w glebie wpływają korzystnie na działanie środka. W czasie suszy lub chłódów środek działa wolniej.

Środek wykazuje selektywność czynną tzn. buraki posiadają zdolność rozkładu preparatu do związków nieaktywnych.

Najskuteczniej działa na intensywnie rosnące chwasty od wschodów do początku fazy dwóch liści właściwych.

## 📄 ZASTOSOWANIE

### Stosowania środka pojedynczo:

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,13 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 3.

### Stosowanie środka Solider w mieszaninie zbiornikowej w celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastów:

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Solider 0,1 l/ha + adiuwant Asystent+ 0,1 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 3-4.

Odstęp między zabiegami 5-10 dni.

## ☑ ZWALCZA NASTĘPUJĄCE CHWASTY

### STOSOWANIE ŚRODKA POJEDYNCZO:

**Chwasty wrażliwe:** fiołek polny, przytulia czepna, szarłat szorstki.

**Chwasty średniowrażliwe:** komosa biała, samosiewy rzepaku, maruna bezwonna, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity.

### STOSOWANIE ŚRODKA W MIESZANINIE:

- **3 aplikacje:** Solider + adiuwant Asystent+

**Chwasty wrażliwe:** fiołek polny, szarłat szorstki, gwiazdnica pospolita, komosa biała.

**Chwasty średniowrażliwe:** samosiewy rzepaku, przytulia czepna, maruna bezwonna.

- **4 aplikacje:** Solider + adiuwant Asystent+

**Chwasty wrażliwe:** fiołek polny, szarłat szorstki, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, maruna bezwonna.

**Chwasty średniowrażliwe:** tasznik pospolity, rdest ptasi

## 📅 TERMIN STOSOWANIA

Środek stosować od fazy widocznego pierwszego liścia właściwego buraka do momentu zakrycia międzyrzędzi (BBCH 10-39).



Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

- Solider pojedynczo: 0,13 l/ha
- Solider w mieszaninie zbiornikowej z adiuwantem Asystent+: 0,1 l/ha



 [ar.agro.pl](http://ar.agro.pl)

 [www.chemirol.com.pl](http://www.chemirol.com.pl)

 [www.facebook.com/byChemirol](https://www.facebook.com/byChemirol)