



SKUTECZNY NA INSERTY

UJARZMI  
SZKODNIKI



51

#### Uwaga

Działa szkodliwie  
w kontakcie ze skórą  
Działa drażniąco na oczy  
Działa szkodliwie  
w następstwie wdychania  
Działa toksycznie na  
organizmy wodne,  
powodując długotrwałe  
skutki

Unikać wdychania  
pyłu/dymu/gazu/mgły/  
par/ rozpylonej cieczy  
Dokładnie umyć ręce po  
użyciu

Stosować rękawice  
ochronne/odzież  
ochronną/ochronę  
oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU  
ZE SKÓRĄ: umyć dużą  
ilością wody

W PRZYPADKU DOSTANIA  
SIĘ DO DROG ODDECHO-  
WYCH: wyprowadzić lub

wynieść poszkodowanego  
na świeże powietrze  
i zapewnić mu warunki do  
swobodnego oddychania  
W przypadku utrzymywa-  
nia się działania  
drażniącego na oczy:  
Zasięgnąć porady/zgłosić  
się pod opiekę lekarza

Preparat Rodeo (GS03) nie  
jest chemicznym środkiem  
ochrony roślin w  
rozumieniu rozporządzenia  
WE Nr 1107/2009.

Stosowanie preparatu jest  
metodą alternatywną  
(fizyczną) w stosunku do  
metod chemicznych  
ochrony roślin przed  
szkodnikami zgodnie  
z opinią MRiRW  
JPR.kor.831.6.2021



## Innowacyjna kompozycja niejonowych surfaktantów i polimerów.

Rodeo to preparat zwalczający metodą fizyczną drobne insekty w sadach, warzywach i na polu. Zwiększa skuteczność tradycyjnych środków ochrony roślin. Tworzy lepką powłokę o szybkim działaniu, szerokie spektrum zwalczanych szkodników.

Preparat stosować po zauważeniu pierwszych szkodników. Preparat należy stosować poza okresami aktywności pszczoł, na rośliny suche i nieuszkodzone.

## PRZYGOTOWANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do połowy jego objętości i włączyć mieszadło. Dodać preparat do zbiornika w określonej ilości. Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą przy włączonym mieszadle (nie napełniać wodą pod dużym ciśnieniem). Puste opakowanie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza. Po zakończeniu pracy dokładnie umyć opryskiwacz. Z uwagi na właściwości polimerizujące preparatu, w przypadku niewykorzystania całej zawartości opakowania, butelkę szczelnie zakręcić.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przestrzegać środków ostrożności obowiązujących dla środków ochrony roślin stosowanych łącznie z preparatem. Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane użyciem preparatu niezgodnym z instrukcją stosowania.

## PRZECHEWYWANIE I USUWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 40°C z dala od produktów spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci i osób niepełnowolnych. Całkowicie opróżnione opakowanie usunąć w sposób bezpieczny.

## STOSOWANIE I DAWKA

### ZBOŻA

mszyce, skoczki, wciornastki

zalecane stężenie: 0,15-0,2%  
(150-200 ml preparatu w 100 l wody)  
Zalecana ilość wody: 200 l/ha

### RZEPAK

mszyce, słodyszek rzepakowy, chowacz, mączlik szklarniowy, pchełki, śmietka kapuściana (zwalczanie nalatujących owadów)

zalecane stężenie: 0,15-0,2%  
(150-200 ml preparatu w 100 l wody)  
Zalecana ilość wody: 200 l/ha

### BURAK CUKROWY

mszyce, śmietka pchełki, przedziorek

zalecane stężenie: 0,15-0,2%  
(150-200 ml preparatu w 100 l wody)  
Zalecana ilość wody: 200 l/ha

### ZIEMIŃIAK

mszyce

zalecane stężenie: 0,15-0,2%  
(150-200 ml preparatu w 100 l wody)  
Zalecana ilość wody: 200 l/ha

### KUKURYDZA

ploniarka zbożowa (zwalczanie nalatujących muchówek)

zalecane stężenie: 0,15-0,2%  
(150-200 ml preparatu w 100 l wody)  
Zalecana ilość wody: 200 l/ha

### ROŚLINY SADOWNICZE

Drzewa owocowe: jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia, czereśnia, morela, brzoskwinia

mszyce, przedziorki

zalecane stężenie: 0,1-0,2%  
(100-200 ml preparatu w 100 l wody)

śliwa, jabłoń, grusza

larwy miseczników  
zalecane stężenie: 0,1-0,2%  
(100-200 ml preparatu w 100 l wody)

Porzeczka, malina, truskawka

mszyce, przedziorki  
zalecane stężenie: 0,1-0,2%  
(100-200 ml preparatu w 100 l wody)

Zalecana ilość wody: 500 – 700 l/ha

Liczba zabiegów: środek może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym

Stosować przed i po kwitnieniu drzew i krzewów owocowych.

### WARZYWA

Pomidor, papryka, fasola, bób, burak ćwikłowy, ogórek

mszyce  
zalecane stężenie: 0,05% - 0,1%  
(50 ml-100 ml preparatu w 100 l wody)

Pomidor, ogórek i inne dyniowate, fasola i inne rośliny motylkowe grubonasienne

przedziorki  
zalecane stężenie: 0,2%  
(200 ml preparatu w 100 l wody)

kapusta pekińska, brokuły, kalafiori

mączlik warzywny  
zalecane stężenie: 0,1%  
(100 ml preparatu w 100 l wody)

### ROŚLINY OZDOBNE

mszyce

zalecane stężenie: 0,05% - 0,1%  
(50 ml – 100 ml preparatu w 100 l wody)  
Wyższe od zalecanych stężeń stosować w przypadku dużego nasilenia szkodnika. W razie konieczności zabieg powtórzyć po 14 dniach.  
przedziorki  
zalecane stężenie: 0,1 - 0,15%  
(100 - 150 ml preparatu w 100 l wody)  
W razie konieczności zabieg powtórzyć po 7 dniach

UFI: D200-U0CW-500J-QS32

Podmiot odpowiedzialny:

PUH Chemirol Sp. z o.o.  
Ul. Przemysłowa 3,  
88-300 Mogiło  
Tel. 52 3188879  
bio@chemirol.com.pl

Producent:  
SMP Agro Sp. z o.o.  
63-004 Tulce,  
Komorniki 44  
tel.: 61 666 10 16

Okres ważności: 3 lata  
Data produkcji: na opakowaniu  
Nr partii: na opakowaniu