




Cropvit

**KONCENTRATY NAWOZOWE
NA KAŻDĄ POTRZEBĘ**





KONCENTRAT NAWOZOWY BORU W FORMIE ORGANICZNEJ

- Płynny nawóz dolistny o wysokiej zawartości boru (150 g/l)
- Zwiększa żywotność pyłków, przez co wspomaga proces kwitnienia
- Wspomaga rozwój strefy włośnikowej systemu korzeniowego
- Wpływa na proces syntezy białka
- Zwiększa odporność roślin na negatywne warunki atmosferyczne
- Podnosi efektywność pobierania składników pokarmowych z gleby
- Poprawia zdolności przechowalnicze

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

5l 20l 1000l

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH

Składniki nawozu	% m/m	g w 1l nawozu
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie	11,00	150,00

STOSOWANIE


Uprawa	Zalecane terminy stosowania	Dawka nawozu (l/ha)
Burak cukrowy i pastewny	2-4 opryski od fazy 4 liści do zakrywania międzyrzędzi, co 10-14 dni	1,0 - 5,0
Rzepak	Formowanie rozety	1,0 - 2,0
	Ruszenie wegetacji	1,0 - 3,0
	Wydłużanie pędu	
	Faza zielonego pąka	
Ziemniak	1-2 opryski przed kwitnieniem, co 10-14 dni	1,0 - 2,0
Kukurydza	1-2 opryski od fazy 7-8 liści, co 10-14 dni	1,0 - 3,0
Strączkowe	Przed kwitnieniem	1,0 - 2,0
	Po kwitnieniu	
Tytoń	2-3 opryski od rozpoczęcia wzrostu, co 10-14 dni	1,0 - 2,0
Truskawka	Początek pąkowania	1,0 - 2,0
	Początek kwitnienia	
Warzywa	2 opryski w okresie intensywnego wzrostu	1,0 - 2,0
Drzewa i krzewy owocowe	Różowienie pąków	1,0 - 3,0
	Po kwitnieniu	
	Początek wzrostu zawiązków	
	Po zbiorach przed opadaniem liści	
Inne	0,2-0,5 litra nawozu na 100 litrów cieczy	1,0 - 3,0

Ilość cieczy użytkowej [l/ha]: 200-300- uprawy polowe, 400-1000-sady



Cropvit BMo

KONCENTRAT NAWOZOWY BORU Z MOLIBDENEM



- Płynny nawóz dolistny o wysokiej zawartości boru (150 g/l) i molibdenu (6 g/l)
- Zwiększa żywotność pyłków, przez co wspomaga proces kwitnienia
- Intensyfikuje rozwój strefy włośnikowej systemu korzeniowego
- Zwiększa odporność roślin na negatywne warunki atmosferyczne
- Podnosi efektywność pobierania składników pokarmowych z gleby
- Poprawia parametry jakościowe plonu
- Zdecydowanie zwiększa wykorzystanie azotu

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

5l 20l

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH

Składnik	% m/m	g/l
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie	11,00	150,00
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie	0,44	6,00

STOSOWANIE

Uprawa	Zalecana liczba zabiegów	Zalecane terminy stosowania	Zalecana dawka (l/ha)	Zalecana ilość cieczy użytkowej (l/ha)
Zboża	1 - 2	Jesień - od fazy 3 liści do spoczynku zimowego. Wiosna - od fazy ruszenia wiosennej roślinności do fazy kłoszenia	0,3 - 0,5	200 - 300
Rzepak	2 - 4	Jesień - od fazy 4 liści właściwych. Wiosna - od fazy ruszenia roślinności do fazy kwitnienia.	1,5 - 3,0	200 - 300
Kukurydza	1 - 2	Od fazy 4 liści do technicznej możliwości wykonania zabiegu ze względu na wysokość roślin.	1,0 - 3,0	200 - 300
Buraki	2 - 4	Od fazy 4 liści do okresu zwracania międzyrzędzi.	1,5 - 3,0	200 - 300
Ziemniaki	1 - 3	W okresach zakrywania międzyrzędzi, zawiązywania i wzrostu bulw.	1,0 - 2,0	200 - 300
Rośliny bobowate	2 - 3	Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia. Podczas rozwoju strąków i nasion.	1,0 - 2,0	200 - 300
Drzewa i krzewy owocowe	2 - 4	I - Podczas różowienia pąków, II - Po kwitnieniu, III - Na początku wzrostu zawiązków, IV - Po zbiorach przed opadaniem liści.	1,0 - 3,0	400 - 1000
Truskawka	2 - 3	Początek pąkowania. Początek kwitnienia	1,0 - 2,0	300 - 500
Warzywa	2 - 3	Profilaktycznie - w okresie intensywnego wzrostu roślin. Interwencyjnie - w momencie rozpoznania niedoboru, powtórzyć po 14 dniach.	1,0 - 2,0	300 - 500
Tytoń	2 - 3	Od fazy wzrostu i rozwoju roślin, powtarzać co 10-14 dni.	1,0 - 2,0	200 - 300
Łąki i pastwiska	1 - 2	Od momentu ruszenia wiosennej roślinności. Kolejne zabiegi wykonywać ok 7 dni po każdym pokosie lub wypasie zwierząt.	0,3 - 0,5	200 - 300



KONCENTRAT NAWOZOWY MIEDZI Z EDTA I KOMPLEKSEM ORGANICZNYM

- Płynny nawóz dolistny o wysokiej zawartości miedzi, całkowicie bezpieczny dla roślin
- Zwiększa zawartość białka i podnosi parametry jakościowe plonu
- Zwiększa odporność roślin na stresy biotyczne i abiotyczne
- Zwiększa mechaniczną wytrzymałość roślin
- Odpowiada za efektywniejsze wykorzystanie azotu
- Wpływa stymulująco na ilość i jakość plonu

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

5l 20l 1000l

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH

Składnik	% m/m	g/l
Azot amidowy (N-NH₂)	5,0	62,0
Trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie	7,5	93,0
Miedź (Cu) rozpuszczalny w wodzie	6,0	74,4
Schelatowana przez EDTA	0,14	
Skompleksowana cytrynianem	5,86	

STOSOWANIE

Roślina	Terminy oprysków	Dawki nawozu (l/ha)
Zboża	1-2 opryski od fazy krzewienia do kłoszenia	1-2
	Po kwitnieniu	
Rzepak	Jesień, ruszenie wegetacji, wydłużanie pędu	0,5
Kukurydza	3-6 liści	0,5
	8-10 liści	1
Ziemniaki	Po wschodach (10-15 cm wysokości), przed zwarem międzyrzędzi	1
	Po kwitnieniu	0,5
Buraki cukrowe i pastewne	4-6 liści właściwych, 8-10 liści właściwych	0,5
	Przed zwarem międzyrzędzi	1
Warzywa w gruncie i pod osłonami	Zapobiegawczo lub po wystąpieniu objawów niedoborów - 2-3 opryski co 10-14 dni	1-2
Drzewa i krzewy owocowe		2-3
Inne	0,5 litra nawozu na 100 litrów cieczy	

Ilość cieczy użytkowej [l/ha]: 200-300 - uprawy polowe; 400-1000 - sady

Dogłębowo - stosować w stężeniu 0,2-0,4 - należy zbilansować dawkę z bieżącymi potrzebami roślin i zawartością miedzi w pożywce



JEDNOSKŁADNIKOWY PŁYNNY NAWÓZ DOLISTNY Z WYSOKĄ ZAWARTOŚCIĄ MANGANU

- Płynny nawóz dolistny o wysokiej zawartości manganu, całkowicie bezpieczny dla roślin
- Zwiększa odporność roślin na choroby fizjologiczne
- Wzmacnia zimotrwałość roślin
- Wspomaga metabolizm związków azotowych
- Stymuluje proces pobierania fosforu
- Poprawia proces fotosyntezy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

5l 20l 1000l

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH

Składnik	% m/m	g/l
Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie	11,3	160,0

STOSOWANIE

Roślina	Terminy oprysków	Dawka nawozu (l/ha)
Zboża	- faza 2-3 liści - po krzewieniu do fazy drugiego kolanka	1-2
Rzepak	- po ruszeniu wegetacji - w fazie zielonego pąka	1-2
Ziemniak	3 tygodnie po wschodach	1-2
Burak cukrowy	faza 4-8 liści	1-2
Warzywa, drzewa i krzewy owocowe	zapobiegawczo lub po wystąpieniu objawów niedoboru, 2-3 opryski co 10-14 dni	1-2

Ilość cieczy użytkowej: 200-300 l/ha - uprawy polowe; 400-1000 l/ha sady.



ROZTWÓR NAWOZOWY NP 5/35

- Płynny nawóz dolistny o wysokiej zawartości fosforu, całkowicie bezpieczny dla roślin
- Poprawia jędrność i wybarwienie owoców
- Wpływa na proces syntezy białka
- Wspomaga rozwój systemu korzeniowego
- Dostarcza roślinom potrzebnej energii do wzrostu i rozwoju w okresach występowania negatywnych warunków atmosferycznych

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

5l 20l 1000l

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH

Składnik	% m/m	g/l
Azot całkowity (N) rozpuszczalny w wodzie	5,0	70,0
Azot amidowy (NH ₂)	5,0	
Pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie	35,0	500,0

STOSOWANIE

Uprawa	Zalecana liczba zabiegów	Zalecane terminy stosowania	Zalecana dawka (l/ha)	Zalecana ilość cieczy użytkowej (l/ha)
Zboża	2 - 4	Jesień - od fazy 3 liści do spoczynku zimowego. Wiosna - od fazy ruszenia wiosennej roślinności do fazy kłoszenia.	3,0 - 5,0	200 - 300
Rzepak	2 - 3	Jesień - od fazy 4 liści właściwych do spoczynku zimowego. Wiosna - od fazy ruszenia roślinności do fazy kwitnienia.	3,0 - 5,0	200 - 300
Kukurydza	2 - 3	Od fazy 4 liści do technicznej możliwości wykonania zabiegu ze względu na wysokość roślin.	3,0 - 6,0	200 - 300
Buraki	1 - 2	Od fazy 4 liści do okresu zwracania międzyrzędzi.	2,0 - 5,0	200 - 300
Ziemniaki	1 - 2	Od wyraźnych wschodów roślin do okresu zwracania międzyrzędzi.	2,0 - 6,0	200 - 300
Rośliny bobowate	1 - 2	Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia. Zalecany zabieg podczas rozwoju liści oraz rozwoju pąków.	2,0 - 5,0	200 - 300
Łąki i pastwiska	2 - 4	Od fazy ruszenia roślinności. Następne zabiegi wykonywać ok. 7 dni po każdym pokosie roślin lub wypasie zwierząt.	3,0 - 5,0	200 - 300
Drzewa i krzewy owocowe	4 - 7	Wiosna (jędrność owoców) - koniec kwitnienia, następnie co 7-14 dni. Jesień (wybarwienie owoców) - opryski zakończyć do 14 dni przed zbiorem owoców.	roztwór o stężeniu 0,5 - 0,8%	700 - 1000
Warzywa kapustne	2 - 3	I - 2 tygodnie po wysadzeniu rozsady, II - początek wiązania główek, III - 14 dni później.	roztwór o stężeniu opryski: 0,5% podlewanie: 1,0%	400 - 600
Warzywa korzeniowe	2 - 3	Rozpocząć opryski 2-3 tygodnie po wschodach roślin, zakończyć 6 tygodni przed zbiorem warzyw.		
Warzywa cebulowe	2 - 3	Rozpocząć opryski we wczesnej fazie rozwoju, zakończyć 4 tygodnie przed zbiorem.		



ROZTWÓR NAWOZOWY PK 10/19 Z MIKROSKŁADNIKAMI POKARMOWYMI

- Płynny całkowicie rozpuszczalny nawóz dolistny o wysokiej zawartości fosforu i potasu
- Zawiera mikroelementy w formie chelatu EDTA
- Intensyfikuje wzrost i rozwój systemu korzeniowego
- Zwiększa odporność roślin na chłody oraz okresy posuchy
- Daje energii do wzrostu i rozwoju
- Poprawia parametry jakościowe plonu

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

5l 20l 1000l

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH

Składnik	% m/m	g/l	Składnik	% m/m	g/l
P₂O₅ rozp. w wodzie	10,0	131,40	Żelazo (Fe) całkowite schelatowane przez DTPA	0,100	1,30
K₂O rozp. w wodzie	19,0	249,70		0,100	
Bor (B) całkowity	0,200	2,60	Cynk (Zn) całkowity	0,200	2,60

STOSOWANIE

Uprawa	Zalecana liczba zabiegów	Zalecane terminy stosowania	Zalecana dawka (l/ha)	Zalecana ilość cieczy użytkowej (l/ha)
Zboża	2-4	Jesień - od fazy 3 liści do spoczynku zimowego. Wiosna - od fazy ruszenia wiosennej vegetacji do fazy kłoszenia. Po kwitnieniu	1,5-3,0	200-300
Rzepak	2-4	Jesień - od fazy 4 liści właściwych do spoczynku zimowego. Wiosna - od fazy ruszenia vegetacji do fazy kwitnienia. Po kwitnieniu	2,0-3,0	200-300
Kukurydza	2-3	Od fazy 4 liści do technicznej możliwości wykonania zabiegu ze względu na wysokość roślin.	2,0-3,0	200-300
Buraki	1-2	Od fazy 4 liści do okresu zwarcia międzyrzędzi.	2,0-3,0	200-300
Ziemniak	1-2	Od wyraźnych wschodów roślin do okresu zwarcia międzyrzędzi.	2,0-3,0	200-300
Rośliny bobowate	1-2	Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia. Zalecany zabieg podczas rozwoju liści oraz rozwoju pąków.	2,0-3,0	200-300
Łąki i pastwiska	2-4	Od fazy ruszenia vegetacji roślin. Następne zabiegi wykonywać ok 7 dni po każdym pokosie roślin lub wypasie zwierząt.	1,5-3,0	200-300
Drzewa i krzewy owocowe	3-5	I - przed kwitnieniem, II - po kwitnieniu, III zabieg i kolejne w okresie wzrostu owoców w odstępach 7-14 dniowych.	2,0-4,0	200-600
Truskawka	3-5	I - przed kwitnieniem, II - po kwitnieniu, III zabieg i kolejne w okresie wzrostu owoców w odstępach 7-14 dniowych.	2,0-4,0	200-600
Winorośl	3-5	I - przed kwitnieniem, II - po kwitnieniu, III zabieg i kolejne w okresie wzrostu owoców w odstępach 7-14 dniowych.	2,0-4,0	200-600
Warzywa cebulowe	2-3	I - po wykształceniu się 2-3 liści, II i III po 14 dniach od pierwszego zabiegu w odstępach 14 dniowych.	2,0-6,0	200-600
Warzywa kapustne	2-3	I - 2-3 tygodnie po wysadzeniu rozsady, II i III po 14 dniach od pierwszego zabiegu w odstępach 14 dniowych.	2,0-6,0	200-600
Warzywa korzeniowe	2-4	W okresach intensywnego wzrostu. Powtarzać co 7-14 dni.	2,0-6,0	200-600
Rośliny ozdobne	2-3	I - w okresie intensywnego wzrostu vegetatywnego, II - w okresie zawiązywania pąków kwiatowych, III - początek kwitnienia.	2,0-6,0	200-600
Inne uprawy rolnicze i ogrodnicze	2-4	W okresach intensywnego wzrostu. Powtarzać co 7-14 dni.	2,0-6,0	200-600



Cropvit POWER



WYSOKOAZOTOWY NAWÓZ WE

- Wysokoazotowy płynny nawóz dolistny wzbogacony o magnez, molibden, nikiel i tytan
- Zawiera trzy formy azotu całkowicie bezpieczne dla roślin
- Skutecznie stymuluje rośliny do wzrostu i rozwoju
- Wspomaga pobieranie składników pokarmowych z gleby
- Zdecydowanie zwiększa odporność roślin na czynniki stresowe

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

5l 20l 1000l

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH

Składnik	% m/m	g/l
Azot całkowity (N) rozpuszczalny w wodzie	26,0	346,84
Azot azotanowy (NO ₃)	4,6	
Azot amonowy (NH ₄)	2,5	
Azot amidowy (NH ₂)	18,9	
Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie	3,1	41,35
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie	0,001	0,013

STOSOWANIE

Uprawa	Zalecana liczba zabiegów	Zalecane terminy stosowania	Zalecana dawka (l/ha)	Zalecana ilość cieczy użytkowej (l/ha)
Zboża	2 - 4	Jesień - od fazy 3 liści do spoczynku zimowego. Wiosna - od fazy ruszenia wiosennej vegetacji do pełnej dojrzałości ziarna.	3,0 - 10,0	200 - 300
Rzepak	2 - 4	Jesień - od fazy 4 liści właściwych do spoczynku zimowego. Wiosna - od fazy ruszenia vegetacji do fazy kwitnienia.	3,0 - 10,0	200 - 300
Kukurydza	2 - 3	Od fazy 4 liści do technicznej możliwości wykonania zabiegu ze względu na wysokość roślin.	3,0 - 10,0	200 - 300
Buraki	2 - 3	Od fazy 4 liści do okresu zwarcia międzyrzędzi.	3,0 - 10,0	200 - 300
Ziemniaki	2 - 3	Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia. Możliwy zabieg po kwitnieniu.	3,0 - 10,0	200 - 300
Rośliny bobowate	1 - 2	Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia.	3,0 - 9,0	200 - 300
Drzewa i krzewy owocowe	3 - 4	Profilaktycznie - stosować w całym okresie vegetacji. Interwencyjnie - w momencie rozpoznania niedoboru, powtórzyć po 14 dniach.	7,0 - 10,0	400 - 1000
Truskawka	2 - 3	Przed kwitnieniem. Po kwitnieniu. Następny zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.	2,0 - 5,0	400 - 1000
Warzywa	2 - 4	2-3 tygodnie po wschodach roślin, w odstępach 10 dniowych. Nie później niż 14 dni przed zbiorem.	3,0 - 10,0	300 - 500
Łąki i pastwiska	2 - 4	Od fazy ruszenia vegetacji roślin. Następne zabiegi wykonywać ok. 7 dni po każdym pokosie roślin lub wypasie zwierząt.	3,0 - 10,0	200 - 300
Trawniki, boiska	2 - 4	Od momentu ruszenia wiosennej vegetacji przez cały okres wiosenno-letni w odstępach 14-21 dniowych.	3,0 - 10,0	200 - 300



KONCENTRAT NAWOZOWY CYNKU Z EDTA I KOMPLEKSEM ORGANICZNYM

- Wpływa na stabilny wzrost i rozwój roślin oraz powstawanie białek
- Uczestniczy w syntezie chlorofilu
- Wspomaga koncentrację składników jakościowych
- Odpowiedni poziom cynku w roślinie powoduje zwiększenie odporności na suszę, choroby oraz lepszą mrozoodporność
- Wspomaga wykorzystanie azotu

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

5l 20l 1000l

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH


Składnik	% m/m	g/l
Azot amidowy (N-NH₂)	5,0	66,5
Trójtlenek siarki (SO₃) rozp. w wodzie	10,0	133,0
Cynk (Zn) rozp. w wodzie	8,0	106,4
Schelatowana przez EDTA	1,2	
Skompleksowany cytrynianem	6,8	

STOSOWANIE

Roślina	Terminy oprysków	Dawki nawozu (l/ha)
Kukurydza	2 opryski od fazy 7-8 liści, co 10-14 dni	1-2
Zboża	Pełnia krzewienia	1
	Początek strzelania w źdźbło (BBCH 31)	1-2
	Pełnia strzelania w źdźbło (BBCH34)	1
Rzepak	4-6 liści, ruszenie wiosennej wegetacji, wydłużanie pędu	1
Ziemniak	Po wschodach (10-15 cm wys.)	2
	Przed zwarcie międzyrzędzi	1
Burak cukrowy i pastewny	4 liście właściwe, 8-10 liści właściwych	1
Bobowate	Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia.	1-2
Tytoń	Wykonać dwa opryski w odstępach 10-14 dni od momentu wzrostu roślin.	1-2
Chmiel	Wykonać 2-3 opryski w odstępach 10-14 dni od połowy czerwca.	3-5
Drzewa i krzewy owocowe	I - Różowienie pąków, II - po kwitnieniu, III - początek wzrostu zawiązków.	2-3
Inne	Profilaktycznie - w okresie szybkiego wzrostu roślin. Interwencyjnie - w momencie rozpoznania niedoboru, powtórzyć po 14 dniach.	1-2

Ilość cieczy użytkowej (l/ha): 200-300 - uprawy polowe, 400-1000 - sady

Doglebowo: stosować w stężeniu 0,2-0,4 - należy zbilansować dawkę z bieżącymi potrzebami roślin i zawartością cynku w pożywce



MIESZANINA MIKROSKŁADNIKÓW POKARMOWYCH: ŻELAZO (FE) EDTA, MOLIBDEN (MO)

- Istotny przy wiązaniu azotu atmosferycznego przez bakterie brodawkowe i endofity
- Bierze udział w przemianach azotu i fosforu w roślinie
- Wchodzi w skład chlorofilu i witamin
- Zbilansowany tak, aby efektywnie odżywić rośliny molibdenem i żelazem
- Zwiększa zimotrwałość dzięki redukcji azotanów

DOSTĘPNE OPAKOWANIA


11

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH

Cropvit FeMo	% m/m	% g/l
Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie, schelatowane przez EDTA	0,8	9,76
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie	8,2	100,04

STOSOWANIE

Uprawa	Zalecana liczba zabiegów	Zalecane terminy stosowania	Faza BBCH	Zalecana dawka (l/ha)	Zalecana ilość cieczy użytkowej (l/ha)
Uprawy rolnicze					
Zboża	1	faza krzewienia	14-18	0,1 - 0,2	200-300
Rzepak	2	faza 4-8 liści	14-18	0,1 - 0,2	
		strzelanie w pęd	30-31	0,1 - 0,2	
Kukurydza	1	faza 4-6 liści	14-16	0,1 - 0,2	
Ziemniaki	1	zakrywanie redlin	31-39	0,1 - 0,2	
Buraki	1	faza 4-8 liści	14-16	0,1 - 0,2	
Soja	1	rozwój pędów bocznych i głównego	21-49	0,1 - 0,2	
Rośliny bobowate	1	wzrost pędu	33-39	0,1 - 0,2	
Uprawy warzywne					
Cebulowe, np. cebula, por	1-3	rozwój liści	13-15	0,1 - 0,2	300-500
		rozwój liści	16-19	0,1 - 0,2	
		rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru	47-49	0,1 - 0,2	
Dyniowate, np. dynia, cukinia, ogórek	1	rozwój liści	16-19	0,1 - 0,2	
Kapustne, np. kapusta kalafior, brokuł	1-2	rozwój liści	14-19	0,1 - 0,2	
		rozwój rozety	31-39	0,1 - 0,2	
Korzeniowe, np. marchew, seler, burak ćwikłowy	2-3	rozwój liści	14-19	0,1 - 0,2	
		rozwój części przeznaczonych do zbioru	41-45	0,1 - 0,2	
		rozwój części przeznaczonych do zbioru	46-49	0,1 - 0,2	
Psiankowate, np. pomidor, papryka	2	rozwój kwiatostanu i kwitnienie	51-69	0,1 - 0,2	
		rozwój owoców	71-79	0,1 - 0,2	
Strączkowe, np. fasola, groszek	2-3	rozwój liści	13-15	0,1 - 0,2	
		rozwój liści	16-19	0,1 - 0,2	
		rozwój kwiatostanu i kwitnienie	51-69	0,1 - 0,2	
Uprawy sadownicze					
Pestkowe, np. wiśnia, czereśnia	1-2	kwitnienie	60-69	0,1 - 0,2	500-800
Ziarnkowe, np. jabłoń, grusza	1-2	kwitnienie	61-65	0,1 - 0,2	
		rozwój owoców	74-79	0,1 - 0,2	
Jagodowe, np. truskawka, borówka	1-2	początek kwitnienia	60-61	0,1 - 0,2	300-500
		kwitnienie	62-69	0,1 - 0,2	



PŁYNNĄ MIESZANINĄ MIKROSKŁADNIKÓW: MIEDZI (CU), MANGANU (MN) I CYNKU (ZN)

- Dostarcza wysoką dawkę mikroelementów, które uczestniczą w najważniejszych procesach fizjologicznych roślin
- Dodatkowo wzbogacony o azot, magnez i siarkę
- Wspomaga pobieranie i wykorzystanie azotu oraz pozostałych składników pokarmowych z gleby
- Wspomaga wysoki potencjał plonotwórczy roślin uprawnych

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

1l 5l 10l

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH

Składnik	% m/m	g/l
Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie	4,300	71
Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie	11,000	181
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie	3,700	61

STOSOWANIE

Uprawa	Zalecana liczba zabiegów	Zalecane terminy stosowania	Zalecana dawka (l/ha)	Zalecana ilość cieczy użytkowej (l/ha)
Zboża	1 - 3	Jesień - od fazy 3 liści. Wiosna - po ruszeniu wiosennej wegetacji do początku kłoszenia.	0,5 - 1,0	200 - 300
Rzepak	1 - 3	Jesień - od fazy 4 liści właściwych Wiosna - po ruszeniu wegetacji do początku kwitnienia.	0,5 - 1,0	200 - 300
Kukurydza	1 - 2	Od fazy 3-4 liści.	0,5 - 1,0	200 - 300
Buraki	1 - 3	Od fazy 4 liści do okresu zwarcia międzyrzędzi.	0,5 - 1,0	200 - 300
Ziemniaki	1 - 4	Od wyraźnych wschodów roślin do zakrycia redlin.	0,5 - 1,0	200 - 300
Rośliny bobowate	1 - 2	Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia.	0,5 - 1,0	200 - 300
Drzewa i krzewy owocowe	1 - 4	Po wytworzeniu liści do fazy różowego pąka. Interwencyjnie - w momencie rozpoznania niedoboru.	0,5 - 1,0	400 - 1000
Warzywa	1 - 4	Pierwszy zabieg wykonać kiedy rośliny osiągną 5-8 cm, następne co 7-10 dni.	0,5 - 1,0	300 - 500
Warzywa z rozsady	1 - 4	Pierwszy zabieg wykonać około 10-14 dni po wysadzeniu rozsady, następne co 7-10 dni.	0,5 - 1,0	300 - 500
Łąki i pastwiska	1 - 3	Od momentu ruszenia wiosennej wegetacji. Kolejne zabiegi wykonywać 7 dni po każdym pokosie.	0,5 - 1,0	200 - 300



Cropvit

Dział Nawozów Dolistnych
tel. 52 318 88 79
PUH „CHEMIROL” Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno
ndo@chemirol.com

