



# Cropvit BMO



## KONCENTRAT NAWOZOWY BORU Z MOLIBDENEM

- Płynny nawóz dolistny o wysokiej zawartości boru (110 g/l) i molibdenu (6 g/l)
- Zwiększa żywotność pyłków, przez co wspomaga proces kwitnienia
- Intensyfikuje rozwój strefy włośnikowej systemu korzeniowego
- Zwiększa odporność roślin na negatywne warunki atmosferyczne
- Podnosi efektywność pobierania składników pokarmowych z gleby
- Poprawia parametry jakościowe plonu
- Zdecydowanie zwiększa wykorzystanie azotu



- Płynny nawóz dolistny o wysokiej zawartości boru (110 g/l) i molibdenu (6 g/l)
- Zwiększa żywotność pyłków, przez co wspomaga proces kwitnienia
- Intensyfikuje rozwój strefy włosnikowej systemu korzeniowego
- Zwiększa odporność roślin na negatywne warunki atmosferyczne
- Podnosi efektywność pobierania składników pokarmowych z gleby
- Poprawia parametry jakościowe plonu
- Zdecydowanie zwiększa wykorzystanie azotu

### ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH

| Składnik                                    | % m/m | g/l    |
|---------------------------------------------|-------|--------|
| <b>Bor (B)</b> rozpuszczalny w wodzie       | 11,00 | 150,00 |
| <b>Molibden (Mo)</b> rozpuszczalny w wodzie | 0,45  | 6,00   |

### STOSOWANIE

| Uprawa                  | Zalecana liczba zabiegów | Zalecane terminy stosowania                                                                                                             | Zalecana dawka (l/ha) | Zalecana ilość cieczy użytkowej (l/ha) |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Zboża                   | 1 - 2                    | Jesień - od fazy 3 liści do spoczynku zimowego.<br>Wiosna - od fazy ruszenia wiosennej roślinności do fazy kłoszenia                    | 0,3 - 0,5             | 200 - 300                              |
| Rzepak                  | 2 - 4                    | Jesień - od fazy 4 liści właściwych.<br>Wiosna - od fazy ruszenia roślinności do fazy kwitnienia.                                       | 1,0 - 3,0             | 200 - 300                              |
| Kukurydza               | 1 - 2                    | Od fazy 4 liści do technicznej możliwości wykonania zabiegu ze względu na wysokość roślin.                                              | 1,0 - 2,0             | 200 - 300                              |
| Buraki                  | 2 - 4                    | Od fazy 4 liści do okresu zwarcia międzyrzędzi.                                                                                         | 1,0 - 3,0             | 200 - 300                              |
| Ziemniaki               | 1 - 3                    | W okresach zakrywania międzyrzędzi, zawiązywania i wzrostu bulw.                                                                        | 1,0 - 2,0             | 200 - 300                              |
| Rośliny bobowate        | 2 - 3                    | Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia.<br>Podczas rozwoju strąków i nasion.                                                   | 1,0 - 2,0             | 200 - 300                              |
| Drzewa i krzewy owocowe | 2 - 4                    | I - Podczas różowienia pąków,<br>II - Po kwitnieniu,<br>III - Na początku wzrostu zawiązków,<br>IV - Po zbiorach przed opadaniem liści. | 1,0 - 3,0             | 400 - 1000                             |
| Truskawka               | 2 - 3                    | Początek pąkowania. Początek kwitnienia                                                                                                 | 1,0 - 2,0             | 300 - 500                              |
| Warzywa                 | 2 - 3                    | Profilaktycznie - w okresie intensywnego wzrostu roślin. Interwencyjnie - w momencie rozpoznania niedoboru, powtórzyć po 14 dniach.     | 1,0 - 2,0             | 300 - 500                              |
| Tytoń                   | 2 - 3                    | Od fazy wzrostu i rozwoju roślin, powtarzać co 10-14 dni.                                                                               | 1,0 - 2,0             | 200 - 300                              |
| Łąki i pastwiska        | 1 - 2                    | Od momentu ruszenia wiosennej roślinności. Kolejne zabiegi wykonywać ok 7 dni po każdym pokosie lub wypasie zwierząt.                   | 0,3 - 0,5             | 200 - 300                              |

