

Skondensowana, zawieszinowa formuła. Aż 600 g tlenochlorku miedzi w 1 l.

Taką miedź musisz mieć!



Podwójne działanie:
tworzenie bariery przed stresami
biotycznymi i dokarmianie
dolistne miedzią.



**Unikatowa
formuła nawozu
z wbudowanym
adiuwantem.**



**Polecany do upraw
sadowniczych, jagodowych,
warzywniczych oraz
rolniczych**
w okresach wzmożonego
zapotrzebowania.



**Trwała zawieszina
w cieczy użytkowej.**



**Wysoka odporność na
zmywanie przez deszcz.**



**Wykazuje działanie
fungistatyczne.**

Nie czekaj – postaw na **NIEBIESKĄ** siłę!

CHEMIROL

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l

Skład:

Miedź (Cu) całkowita 350 [g/l]
Tlenochlorek miedzi 600 [g/l]

Miedziowy 600 SC to nawóz zawieszinowy, przeznaczony do dokarmiania dolistnego. Szczególnie polecany do roślin o wysokim zapotrzebowaniu na miedź. Zapobiega występowaniu niekorzystnych zmian w roślinach uprawnych spowodowanych niedoborem miedzi. Nawóz wykazuje działanie фунгистатyczne.

Dawkowanie i terminy stosowania:

Uprawa	Dawka	Woda	Terminy stosowania
Jabłoń, grusza	1-1,25 l/ha 1,5 l/ha	500-750 l/ha	Po ruszeniu vegetacji do fazy zielonego pąka włącznie 1-2 zabiegi Po zbiorach owoców
Wiśnia, czereśnia	2-2,75 l/ha 1,0 l/ha 2,5 l/ha	500-750 l/ha	Po ruszeniu vegetacji wiosennej W okresie kwitnienia Po zbiorach owoców
Śliwa	1,5 l/ha 1,5-2,0 l/ha	500-750 l/ha	Zabieg wykonać w okresie nabrzmiewania pąków Po zbiorze owoców oraz w okresie opadania liści
Brzoskwinia	3,5-4,0 l/ha	500-700 l/ha	Bardzo wczesną wiosną tuż przed ruszeniem vegetacji lub jesienią po zbiorach
Truskawka	0,5-1,0 l/ha	400-600 l/ha	Od fazy rozwiniętych 3-4 liści do fazy wybarwiania pierwszych owoców (poza okresem kwitnienia)
Borówka wysoka	0,5 l/ha	400-600 l/ha	Od fazy pęknięcia pąków do fazy przed kwitnieniem oraz po zbiorach owoców
Ziemniak	1,75-2,25 l/ha	200-400 l/ha	Po wytworzeniu pokroju roślin, następny 14 dni później
Zboża	0,5 l/ha	200-300 l/ha	W fazie początku krzewienia
Pomidor, papryka	1,5-1,75 l/ha	500 l/ha	2 tygodnie po wysadzeniu rozsady, następnie 1-3 zabiegi w odstępach 14 dni
Ogórek	1,5-2 l/ha	500 l/ha	Po wytworzeniu 6 liści, następnie 1-3 zabiegi w odstępach 14 dni
Warzywa kapustne	1,0 l/ha	500-700 l/ha	Maksymalnie 2 zabiegi w okresie formowania główki kapusty
Pozostałe uprawy*	0,5 l/ha	500 l/ha	W okresie intensywnego wzrostu i wzmożonego zapotrzebowania

* W uprawie buraka cukrowego, pastewnego oraz ćwikłowego zastosowanie produktu nawozowego Miedziowy 600 SC w dawce 0,5-1,0 l/ha wspiera także ochronę chemiczną m.in. przed chorobami powodowanymi przez chorobotwórcze grzyby.

Wysokoskoncentrowany nawóz zawierający
tlenochlorek miedzi (600 g/l) w formie zawiesziny



Nie czekaj – postaw na **NIEBIESKĄ** siłę!

CHEMIROL