

VITAL PRO

NAWOZY PŁYNNE





Vital Pro Rzepak jest wieloskładnikowym koncentratem do dolistnego dokarmiania rzepaku, gorczycy i roślin kapustnych o optymalnie dobranych składnikach pokarmowych niezbędnych do intensywnego ich rozwoju i wzrostu. Wzmaga proces fotosyntezy i ogólnego metabolizmu, zwiększa odporność na choroby grzybowe i podsuszkowe. Pomaga roślinom wykorzystywać składniki pokarmowe zawarte w glebie przez co wpływa na utrzymanie roślin w bardzo dobrej kondycji w niekorzystnych okresach jak susza. Nie zakwasza gleby, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów, nie zatyka końcówek opryskiwacza.



Skład (% m/m)

Azot całkowity (N) , w tym:	4,00
Azot amidowy (NH ₂)	4,00
Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie	5,00
Trójtlenek siarki (SO ₃) rozpuszczalny w wodzie	11,00
Bor (B) w postaci boroetanoloaminy rozpuszczalny w wodzie	0,56
Miedź (Cu) całkowita, w tym:	0,55
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA rozpuszczalna w wodzie	0,35
Miedź (Cu) w postaci cytrynianu rozpuszczalna w wodzie	0,20
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA rozpuszczalne w wodzie	0,60
Mangan (Mn) w postaci cytrynianu rozpuszczalny w wodzie	1,00
Molibden (Mo) w postaci soli amonowej rozpuszczalny w wodzie	0,004
Cynk (Zn) całkowity, w tym:	0,55
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA rozpuszczalny w wodzie	0,012
Cynk (Zn) w postaci cytrynianu rozpuszczalny w wodzie	0,538

Stosowanie

UPRAWA	TERMIN STOSOWANIA	DAWKOWANIE (l/ha)	IŁOŚĆ ZABIEGÓW
Rzepak jary	Wczesną wiosną, rozwój pierwszych liści	3-5	2
	Formowanie łodygi		
Rzepak ozimy	Jesienny zabieg – pierwsze liście	2-4	3
	Wiosna – ruszenie wegetacji	3-5	3
Gorczyca	Wiosna – pąkowanie	3-5	3
	Faza zielonego pąka	2-4	2 w odstępie 10-14 dni
Kapustne	Od 3 liści	3-5	2 w odstępie 10-14 dni
Ilość cieczy użytkowej [l/ha]: 200-300			



Vital Pro Zboże jest wieloskładnikowym koncentratem do dolistnego dokarmiania zbóż i traw o optymalnie dobranych składnikach pokarmowych niezbędnych do intensywnego ich rozwoju i wzrostu. Wzmaga proces fotosyntezy i ogólnego metabolizmu, zwiększa odporność na choroby grzybowe i podsuszkowe. Pomaga roślinom wykorzystywać składniki pokarmowe zawarte w glebie przez co wpływa na utrzymanie roślin w bardzo dobrej kondycji w niekorzystnych okresach jak susza. Nie zakwasza gleby, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów, nie zatyka końcówek opryskiwacza.



Skład (% m/m)

Azot całkowity (N) , w tym:	4,00
Azot amidowy (NH ₂)	4,00
Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie	5,00
Trójtlenek siarki (SO ₃) rozpuszczalny w wodzie	11,00
Bor (B) w postaci kwasu borowego rozpuszczalny w wodzie	0,16
Miedź (Cu) całkowita, w tym:	0,35
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA rozpuszczalna w wodzie	0,30
Miedź (Cu) w postaci cytrynianu rozpuszczalna w wodzie	0,05
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA rozpuszczalne w wodzie	1,00
Mangan (Mn) w postaci cytrynianu rozpuszczalny w wodzie	0,98
Molibden (Mo) w postaci soli amonowej rozpuszczalny w wodzie	0,005
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA rozpuszczalny w wodzie	0,90

Stosowanie

UPRAWA	TERMIN STOSOWANIA	DAWKOWANIE (l/ha)	IŁOŚĆ ZABIEGÓW
Zboża jare	I zabieg – koniec krzewienia	3-5	2
	Ostatni zabieg – strzelanie w źdźbło		
Zboża ozime	Jesienny zabieg – pierwsze liście	2	3
	Wiosna – krzewienie	3-5	
	Ostatni zabieg – strzelanie w źdźbło		
Trawy, łąki i pastwiska	Od ruszenia wegetacji, następnie ok. 7 dni po każdym pokosie roślin lub wypasie zwierząt	3-5	3-4/rok
Ilość cieczy użytkowej [l/ha]: 200-300			



Vital Pro Kukurydza jest wieloskładnikowym koncentratem do dolistnego dokarmiania kukurydzy o optymalnie dobranych składnikach pokarmowych niezbędnych do intensywnego ich rozwoju i wzrostu. Wzmaga proces fotosyntezy i ogólnego metabolizmu, zwiększa odporność na choroby grzybowe i podsuszkowe. Pomaga roślinom wykorzystywać składniki pokarmowe zawarte w glebie przez co wpływa na utrzymanie roślin w bardzo dobrej kondycji w niekorzystnych okresach jak susza. Nie zakwasza gleby, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów, nie zatyka końcówek opryskiwacza.



Skład (% m/m)

Azot całkowity (N) , w tym:	4,00
Azot amidowy (NH ₂)	4,00
Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie	5,00
Trójtlenek siarki (SO ₃) rozpuszczalny w wodzie	10,00
Bor (B) w postaci boroetanolaminy rozpuszczalny w wodzie	0,35
Miedź (Cu) całkowita, w tym:	0,45
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA rozpuszczalna w wodzie	0,23
Miedź (Cu) w postaci cytrynianu rozpuszczalna w wodzie	0,22
Żelazo (Fe) całkowite, w tym:	0,65
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA rozpuszczalne w wodzie	0,55
Żelazo (Fe) skompleksowane cytrynianem, rozpuszczalne w wodzie	0,10
Mangan (Mn) całkowity, w tym:	1,10
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie	0,19
Mangan (Mn) skompleksowany cytrynianem, rozpuszczalny w wodzie	0,91
Molibden (Mo) w postaci soli amonowej rozpuszczalny w wodzie	0,012
Cynk (Zn) całkowity, w tym:	1,00
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA rozpuszczalny w wodzie	0,47
Cynk (Zn) w postaci cytrynianu rozpuszczalny w wodzie	0,53

Stosowanie

UPRAWA	TERMIN STOSOWANIA	DAWKOWANIE (l/ha)	IŁOŚĆ ZABIEGÓW
Kukurydza	Od fazy 3 liści do technicznej możliwości wykonania zabiegu. Powtarzać w odstępach 7-10 dni	3 – 5	2
Ilość cieczy użytkowej [l/ha]: 200-300			



Vital Pro 36 jest wieloskładnikowym koncentratem do dolistnego dokarmiania upraw o optymalnie dobranych składnikach pokarmowych niezbędnych do intensywnego ich rozwoju i wzrostu. Wzmaga proces fotosyntezy i ogólnego metabolizmu, zwiększa odporność na choroby grzybowe i podsuszkowe. Pomaga roślinom wykorzystywać składniki pokarmowe zawarte w glebie przez co wpływa na utrzymanie roślin w bardzo dobrej kondycji w niekorzystnych okresach jak susza. Nie zakwasza gleby, całkowicie rozpuszczalny w wodzie nie tworzy osadów, nie zatyka końcówek opryskiwacza.



Skład (% m/m)

Azot całkowity (N) , w tym:	26,00
Azot azotanowy (NO ₃)	4,00
Azot amonowy (NH ₄)	3,00
Azot amidowy (NH ₂)	19,00
Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie	3,50
Bor (B) w postaci kwasu borowego rozpuszczalny w wodzie	0,02
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA rozpuszczalna w wodzie	0,20
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA rozpuszczalne w wodzie	0,02
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA rozpuszczalny w wodzie	1,00
Molibden (Mo) w postaci soli amonowej rozpuszczalny w wodzie	0,005
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA rozpuszczalny w wodzie	0,01

Stabilność frakcji schelatowanej w zakresie pH 3-7.

Płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy w roztworze.

Stosowanie

UPRAWA	TERMIN STOSOWANIA	DAWKOWANIE (l/ha)	IŁOŚĆ ZABIEGÓW
Zboża	Zapobiegawczo 1 zabieg w fazie krzewienia	4-6	2-3
	Strzelanie w źdźbło		
Rzepak	Formowanie łodygi – zabieg powtarzać co 10-14 dni	4-6	2-3
Kukurydza	Faza 4-6 liści	4-6	1-2
Burak	Faza 6-10 liści – zabieg powtarzać co 10-14 dni	4-6	1-2
Ziemniak	Faza 4-6 liści	3-6	1
Drzewa i krzewy owocowe	Profilaktycznie – stosować w całym okresie wegetacyjnym. Interwencyjnie – stosować w momencie rozpoznania niedoboru, powtórzyć po 14 dniach.	3-5	1-4
Warzywa	3 dobrze wyrosnięte liście	3-5	1
Ilość cieczy użytkowej [l/ha]: 200-300 – uprawy polowe, 400-750 – sady.			



Vital Pro Bor to nawóz dolistny o formulacji płynnej, przeznaczony do wspomagania odżywiania i dokarmiania roślin w całym okresie wegetacji. Stosując nawóz interwencyjnie w szybkim tempie skutecznie niwelujemy braki boru.



Skład

	% m/m	g w 1 l nawozu
Bor (B) w postaci boroetanoloaminy rozpuszczalny w wodzie	11,0	150,0

Nawóz zawiera 4% (m/m) azotu (N) w postaci aminy.

Stosowanie

UPRAWA	TERMIN STOSOWANIA	DAWKOWANIE (l/ha)
Burak cukrowy i pastewny	2-4 opryski od fazy 4 liści do zakrywania międzyrzędzi, co 10-14 dni	1-3
Rzepak	Formowanie rozety	1-3
	Ruszenie wegetacji	
	Wydłużanie pędu	
	Faza zielonego pąka	
Ziemniak	1-2 zabiegi od zakrycia redlin co 10-14 dni, 1 zabieg po kwitnieniu w fazie wzrostu bulw	1-3
Kukurydza	1-2 opryski od fazy 4-6 liści co 10-14 dni	1-2
Bobowate (strączkowe)	Przed kwitnieniem	1-2
	Po kwitnieniu	
Pszenica jara i ozima	1 aplikacja w fazie od pierwszego kolanka do liścia flagowego	0,3-0,5
Tytoń	2-3 opryski od rozpoczęcia wzrostu co 10-14 dni	1-2
Truskawka	Początek pąkowania	1-2
	Początek kwitnienia	
Warzywa w gruncie	2 opryski w okresie intensywnego wzrostu	1-2
Drzewa i krzewy owocowe	Różowienie pąków	1-3
	Po kwitnieniu	
	Początek wzrostu zawiązków	
	Po zbiorach przed opadaniem liści	
Inne	0,2-0,5 l nawozu na 100 l cieczy	
Ilość cieczy użytkowej [l/ha]: 200-300 - uprawy polowe, 400-1000 - sady.		