

GRAMINICYD

Buster 100 EC



ZWALCZ JEDNOLIŚCIENNE

— Z MOCĄ PRECYZJI —

SKUTECZNY W RZEPAKU OZIMYM I BURAKACH CUKROWYCH

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

GRAMINICYD

DO UPRAW RZEPAKU OZIMEGO
I BURAKÓW CUKROWYCH



Zwalczy chwasty jednoliścienne
w Twoich uprawach rzepaku ozimego
i buraka cukrowego!



Doskonale radzi sobie z perzem właściwym,
chwastnicą jednostronną, miotłą zbożową
czy samosiewami zbóż.



EFEKTY DZIAŁANIA PREPARATU
BUSTER 100 EC
W RZEPAKU OZIMYM

Buster 100 EC

Powoduje żółknięcie roślin, które jest zauważalne po upływie 7 dni od zabiegu.

Pełny efekt chwastobójczy jest widoczny po 2–3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody.

Chwasty roczne są najbardziej wrażliwe na działanie herbicydu w fazie od 2 liści do początku krzewienia, natomiast perz właściwy w fazie 4–6 liści.



RZEPAK OZIMY

ZWALCZANIE SAMOSIEWÓW ZBÓŻ

» JESIENIĄ

Należy stosować od fazy 2. liścia do początku rozwoju pędów bocznych (BBCH 12–21).

Zalecana dawka: 0,3–0,4 l/ha.

Rekomendujemy dodanie adiuwantu olejowego Partner+ w dawce 0,7 l/ha.

» WIOSNĄ

Należy stosować po ruszeniu wegetacji od początku wydłużania pędu do fazy wyraźnego drugiego międzywęźla (BBCH 30–32).

Zalecana dawka: 0,4–0,5 l/ha.

Polecamy stosowanie adiuwantu olejowego Partner+ w dawce 0,7 l/ha.

zalecany termin zabiegu



BURAK CUKROWY

STOSOWANIE

Należy stosować od fazy 2. liścia buraka cukrowego do momentu, gdy rośliny zakryją nie więcej niż 40% międzyrzędzi (BBCH 12–34).

» ZWALCZANIE CHWASTNICY JEDNOSTRONNEJ, MIOTŁY ZBOŻOWEJ, SAMOSIEWÓW PSZENICY

Zalecana dawka: 0,4–0,5 l/ha.


W celu zwiększenia skuteczności środka zaleca się stosowanie łącznie z adiuwantem Partner+ w dawkach: Buster 100 EC 0,35 l/ha + Partner+ 0,7 l/ha.

» ZWALCZANIE PERZU WŁAŚCIWEGO

Zalecana dawka: 1,0–1,5 l/ha.

W celu zwiększenia skuteczności środka zaleca się stosowanie łącznie z adiuwantem Partner+ w dawkach: Buster 100 EC 1,0 l/ha + Partner+ 0,7 l/ha.

zalecany termin zabiegu





 www.blog.chemirol.com.pl

 www.chemirol.com.pl

 www.facebook.com/byChemirol