



kelpak

Płynny koncentrat z alg

OD PONAD 40 LAT ŚWIATOWY LIDER
BIOSTYMULATORÓW NA BAZIE ALG



⌚ Wyjątkowy surowiec

Świeżo zebrane algi
Ecklonia maxima



Algi *Ecklonia maxima*

⌚ Rotacyjne żniwa

Jednolity wiek alg gwarantuje
zawsze ten sam skład i jednolitą
aktywność biologiczną surowca

⌚ Cold Cellular-Burst Technology

Metoda produkcji zachowuje
delikatne związki zawarte
w sokach roślinnych alg

⌚ Efektywne działanie


Zwiększa plon i polepsza jego
jakość przez usprawnienie
procesów fizjologicznych
w roślinach

Główne zalety Kelpaku

- ☑ Intensyfikuje wzrost korzeni bocznych, co poprawia odżywienie rośliny, ułatwia pobieranie wody i rozwój wegetatywny.
- ☑ Wspomaga procesy kwitnienia i zapylania, przyspieszając wzrost łagiewki pyłkowej.
- ☑ Łagodzi efekt stresów biotycznych i abiotycznych oraz redukuje szok związany z przesadzeniem/transplantacją.
- ☑ Szybka regeneracja roślin po spoczynku zimowym oraz przy ruszeniu wegetacji
- ☑ Wpływa na zagęszczenie soków komórkowych w roślinach co przekłada się na podnoszenie produkcji cukru w buraku cukrowym oraz lepsze zawiązywanie bulw i skrobi w ziemniakach



Badania naukowe udowodniły, że Kelpak zwiększa zdrowotność, jakość i plon szerokiej gamy upraw



➤ Kelpak składa się z wielu naturalnych substancji czynnych, są to przede wszystkim:

- ✓ auksyny
- ✓ cytokininy
- ✓ alginiany
- ✓ brassinosteroidy
- ✓ gibereliny
- ✓ florotaniny (Eckol)
- ✓ poliaminy

Powyższe związki działają zarówno indywidualnie oraz zbiorczo, przez co pozwalają uzyskać wiele pożądanych reakcji fizjologicznych.

Tylko w Kelpaku proporcja auksyn do cytokinin to

360:1

➤ Efekty stosowania

RZEPAK



Szybka regeneracja po zimie

- Ruszenie wegetacji wiosennej dawka 2 l/ha
- W okresie kwitnienia dawka 2 l/ha

BURAK CUKROWY



Szybki wzrost oraz produkcja cukru

- Aplikacja od fazy 3 pary liści w dawce 2-4 l/ha
- Dodatkowo 4 tyg. przed zbiorem dawka 2 l/ha

ZIEMNIAK



Szybszy wzrost, lepsze zawiązywanie bulw

- Aplikacja po pełnych wschodach w dawce 2-4 l/ha
- Dodatkowo 4 tyg. przed zbiorem dawka 2 l/ha

KUKURYDZA



Silny wigor początkowy

- Aplikacja w fazie 3-5 liści w dawce 2-3 l/ha

PSZENICA



Stymulacja rozwoju i pobierania składników pokarmowych

- Aplikacja od fazy 4 liści do fazy krzewienia

➤ Optymalne użycie

- Opryski nalistne: nie rozcieńczać w proporcji większej niż 1:500.
- Nawadnianie kropelkowe: nie rozcieńczać w proporcji większej niż 1:1000. Stosować oprysk pulsacyjny przez ostatnie 10 minut cyklu nawadniania. Nie stosować częściej niż co 10 dni.
- Najwydajniejszy w pH poniżej 7,0.
- Kompatybilny z większością agrochemikaliów.



www.kelpak.pl