

Rimel

25 SG

ZAWIERA RIMSULFURON

Nixon

50 SG

ZAWIERA NIKOSULFURON



Ekspert w walce z chwastami
w kukurydzy i ziemniakach

Skutecznie zwalcza chwasty jedno-
i dwuliścienne w kukurydzy



Rimel

25 SG

ZAWIERA RIMSULFURON
związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika
250 g/kg (25%)



- Długi okres stosowania
- Bezwzględny w walce z uciążliwymi chwastami takimi jak: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne
- Błyskawiczna szybkość wnikania
- Bezpieczny dla upraw kukurydzy oraz ziemniaków
- Idealny komponent do mieszanin zbiornikowych
- Pobierany przez liście oraz częściowo przez system korzeniowy chwastów



Nixon

50 SG

ZAWIERA NIKOSULFURON
(związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika)
500 g/kg (50%)



- Skutecznie zwalcza chwasty jednoliścienne i dwuliścienne
- Jest bezpieczny dla uprawy kukurydzy
- Jako pierwszy nikosulfuron na polskim rynku występuje w wysoko skoncentrowanej formulacji granuł, które bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie
- Przy zastosowaniu łącznym z preparatem Rimel 25 SG zwalcza chwasty takie jak: chwastnica jednostronna, fiołek polny, perz właściwy, rdestówka powojowata, rdest płamisty, szarłat szorstki, włośnica sina (przy maksymalnej zalecanej dawce środków)
- Do fazy 8 liści kukurydzy można go stosować w połączeniu z adiuwantem Asystent+



Rimel 25 SG



DZIAŁANIE

Rimel 25 SG jest herbicydem w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w kukurydzy oraz ziemniaku. Rimel 25 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów.

Efekt chwastobójczy jest widoczny w okresie 7-21 dni po zabiegu. Środek najlepiej działa na chwasty jednoroczne, znajdujące się w fazie 2-3 liści. Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5-7 liści (15-25 cm).

Środek Rimel 25 SG stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Asystent+.



ZASTOSOWANIE

Kukurydza, ziemniak

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha.

Środek stosować łącznie z adiuwantem Asystent+ w dawce: Rimel 25 SG 60 g/ha + Asystent+ 0,1 l/ha.



ZWALCZA NASTĘPUJĄCE CHWASTY

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała.



TERMIN STOSOWANIA

• KUKURYDZA

Środek stosować w fazach od 1 liścia do 7 liści kukurydzy (BBCH 10-17).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

• ZIEMNIAK

Środek stosować po wschodach, nie później niż do fazy początku zakrywania międzyrzędzi (do BBCH 30).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.





Nixon 50 SG



DZIAŁANIE

Nixon 50 SG jest środkiem chwastobójczym w postaci granul rozpuszczalnych w wodzie stosowanym dolistnie, przeznaczony do powszechnego zwalczania niektórych gatunków chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w kukurydzy.

Nixon 50 SG jest środkiem chwastobójczym o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez liście i korzenie. Szybko przemieszczany w roślinie, hamuje jej wzrost i rozwój.

Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się młodych liści chwastów oraz zamieranie roślin począwszy od stożków wzrostu.

ZASTOSOWANIE

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Nixon 50 SG 80 g/ha + Rimel 25 SG 40 g/ha + adiuwant Asystent+ 0,1 l/ha.

lub

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Nixon 50 SG 60 g/ha + Rimel 25 SG 30g/ha + adiuwant Asystent+ 0,1 l/ha.



ZWALCZA NASTĘPUJĄCE CHWASTY

Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty.

Chwastnica jednostronna - zalecane stosowanie w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia.

Perz właściwy - zalecane stosowanie w fazie od 3 do 6 liści.

Chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści) są odporne na działanie środka.

Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.

Wrażliwość chwastów na środek Nixon 50 SG w mieszaninie ze środkiem Rimel 25 SG i adiuwantem Asystent+ 0,1 l/ha.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, perz właściwy, rdestówka powojowata, rdest plamisty, szarłat szorstki, włośnica sina (tylko przy maksymalnej zalecanej dawce środków).

Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała.

TERMIN STOSOWANIA

• KUKURYDZA

Zabieg wykonywać wcześniej po wschodach, w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18).

Opryskiwanie wykonywać, gdy większość chwastów dwuliściennych znajduje się w fazie 2-4 liści.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

KIEDY STOSOWAĆ I W JAKICH DAWKACH?

Rimel 25 SG


Rimel 25 SG 50-60 g/ha
zalecany adiuwant
Asystent+ 0,1 l/ha



Rimel 25 SG 50-60 g/ha
Nixon 50 SG 80 g/ha
zalecany adiuwant
Asystent+ 0,1 l/ha



Rimel 25 SG 50-60 g/ha
zalecany adiuwant
Asystent+ 0,1 l/ha




Nixon 50 SG



Rimel 25 SG 40 g/ha
Nixon 50 SG 80 g/ha
zalecany adiuwant
Asystent+ 0,1 l/ha

LUB

Nixon 50 SG 60 g/ha
Rimel 25 SG 30 g/ha
zalecany adiuwant
Asystent+ 0,1 l/ha



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.



 www.blog.chemirol.com.pl

 www.chemirol.com.pl

 www.facebook.com/byChemirol