NOWOŚĆ

Bakto Largo®

PRODUKT MIKROBIOLOGICZNY

Mikrobiologiczne wsparcie regeneracji i wigoru roślin

Produkt przeznaczony do stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych, sadowniczych i jagodowych.



Skład:
Zawiera bakterie *Bacillus laterosporus* w koncentracji **≥ 1 × 10⁹ jtk/ml.**

Bakto Largo to produkt mikrobiologiczny, opracowany z myślą o wspomaganiu regeneracji roślin po uszkodzeniach oraz w okresach zwiększonego obciążenia czynnikami stresowymi.






CHEMIROL

Partner i doradca w rolnictwie

Jak działa Bakto Largo?



Po naniesieniu na roślinę bakterie tworzą naturalną warstwę biologiczną (biofilm) na powierzchni liści i pędów.



Wytwarzane metabolity stymulują procesy regeneracyjne, pomagają utrzymać wysoką aktywność fotosyntetyczną oraz wspierają ciągły rozwój roślin - nawet w warunkach stresowych.



Stosowanie produktu pomaga utrzymać dobrą kondycję roślin, wspiera regenerację po uszkodzeniach oraz sprzyja odbudowie potencjału plonotwórczego.

Korzyści:

- tworzy naturalny biofilm mikrobiologiczny,
- wspomaga regenerację uszkodzonych tkanek,
- poprawia wigor i kondycję roślin,
- wspiera aktywność fizjologiczną i fotosyntetyczną,
- pomaga efektywniej wykorzystywać składniki pokarmowe,
- wspiera naturalne procesy odbudowy i rozwoju roślin,
- pomaga utrzymać wysoką kondycję roślin w okresach stresu.

Dodatkowo

Oprócz działania regeneracyjnego, bakterie *Bacillus laterosporus* wspierają również rozwój systemu korzeniowego oraz poprawiają wykorzystanie składników mineralnych gleby.

Wielokierunkowe działanie **Bakto Largo** sprzyja utrzymaniu dobrej kondycji roślin zarówno w okresach osłabienia, jak i podczas dalszego intensywnego wzrostu i rozwoju.

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l

Zalecane dawkowanie:

Uprawa	Dawka	Termin stosowania	Liczba zabiegów	Ilość wody
Uprawy rolnicze (kukurydza, rzepak)	1,0 l/ha	Przed lub w trakcie wystąpienia stresu	1	150–300 l/ha
Warzywa (kapustne, dyniowate)	1,0–2,0 l/ha	Przed lub w trakcie wystąpienia stresu	1–2	200–500 l/ha
Drzewa ziarnkowe (jabłoń, grusza)	1,0–2,0 l/ha	Przed lub w trakcie wystąpienia stresu	1–2	500–750 l/ha
Drzewa pestkowe (śliwa, wiśnia, czereśnia)	1,0–2,0 l/ha	Przed lub w trakcie wystąpienia stresu	1–2	500–750 l/ha
Rośliny jagodowe (truskawka, malina, porzeczka, agrest, borówka, jeżyna)	1,0–2,0 l/ha	Przed lub w trakcie wystąpienia stresu	1–2	200–500 l/ha