

Etykieta do użytku wewnętrznego, nie stanowi załącznika do zezwolenia, wykonana na podstawie zezwolenia MRiRW nr R-111/2026 z dnia 13.08.2026 r.

Posiadacz zezwolenia:

INNVIKO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, tel.: +48 22 468 26 70, e-mail: biuro@innvigo.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
(...)

Saturion 325 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 200 g/l (17,96%),

difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (11,23%)

Zezwolenie MRiRW nr R-111/2026 z dnia 13.08.2026 r.

	
Niebezpieczeństwo	
H318 H332 H351 H410	Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Podejrzewa się, że powoduje raka. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
EUH208 EUH401	Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P261 P280 P304 + P340 P305 + P351 + P338	Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

*Etykieta środka ochrony roślin Saturion 325 SC
do użytku wewnętrznego, nie stanowi załącznika do zezwolenia MRiRW*

P333 + P313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zebrać wyciek.
P391	

OPIS DZIAŁANIA

FUNGICYD, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC) o działaniu wgłębnym i układowym, przeznaczonym do ochrony przed chorobami powodowanymi przez grzyby i organizmy grzybopodobne. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna difenokonazol należy do grupy 3, a substancja czynna azoksystrobina należy do grupy 11.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieźnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieźnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Rzepak ozimy

stosowanie środka jesienią i wiosną:

zastosowanie jesienią

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, wertycylioza rzepaku

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9-1,0 l/ha

Środek w dawce 1,0 l/ha zaleca się stosować w warunkach nasilonej presji chorób.

Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób od fazy czwartego liścia do fazy BBCH 14 do końca fazy formowania i rozwoju rozety (BBCH 19).

Liczba zabiegów: 1

Uwaga: środek wyłącznie ogranicza występowanie wertycyliozy w rzepaku.

zastosowanie wiosną (należy wykonać jeden zabieg w jednym z następujących terminów):

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, wertycylioza rzepaku

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9-1,0 l/ha

Środek w dawce 1,0 l/ha zaleca się stosować w warunkach nasilonej presji chorób.

Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy, gdy widoczne są pojedyncze pąki kwiatowe, nadal zamknięte (główny kwiatostan) (BBCH 31-55).

Liczba zabiegów: 1

Uwaga: środek wyłącznie ogranicza występowanie wertycyliozy w rzepaku.

zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9-1,0 l/ha

W ochronie przed szarą pleśnią środek w dawce 1,0 l/ha zaleca się stosować w warunkach nasilonej presji choroby.

Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, zgodnie z sygnalizacją, od fazy, gdy otwartych jest 10% kwiatów na głównym kwiatostanie (początek kwitnienia), do fazy końca kwitnienia (BBCH 61-69).

Etykieta środka ochrony roślin Saturion 325 SC

do użytku wewnętrznego, nie stanowi załącznika do zezwolenia MRiRW

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: : średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną)

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 150 dni.

Burak cukrowy

chwościk buraka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

brunatna plamistość liści buraka, mączniak prawdziwy buraka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9-1,0 l/ha

W ochronie brunatną plamistością liści i mączniakiem prawdziwym buraka środek w dawce 1,0 l/ha zaleca się stosować w warunkach nasilonej presji chorób. Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od końca fazy rozwoju rozety (całkowite zakrycie międzywęzli) do fazy gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 39-49).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOObszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Rzepak jary

czern krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, wertycilioza rzepaku

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,9-1,0 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy 4. liścia do fazy dwóch pędów bocznych (BBCH 14-22) oraz od fazy wydłużania pędu głównego do fazy końca kwitnienia (BBCH 31-69).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 150 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Gorczyca biała (w uprawie na nasiona)

czern krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,9-1,0 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, 4. liścia do fazy dwóch pędów bocznych (BBCH 14-22) lub od fazy wydłużania pędu głównego do fazy końca kwitnienia (BBCH 31-69).

*Etykieta środka ochrony roślin Saturion 325 SC
do użytku wewnętrznego, nie stanowi załącznika do zezwolenia MRiRW*

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Mak lekarski (w uprawie na nasiona)

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,9-1,0 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy rozwiniętych czterech liści właściwych do fazy, gdy widoczny jest drugi pęd boczny (BBCH 14-22) lub od fazy początku wydłużania się pędu do fazy końca kwitnienia (widoczne zawiązki owoców) (BBCH 31-69).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Soja (w uprawie na nasiona)

brązowa plamistość liści soi (septorioza soi), chwościk soi, fuzaryjna zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy łodygi, fuzaryjne więdnienie, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,9-1,0 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy, gdy rozwinięty jest trójlistkowy liść na czwartym międzywęźle do fazy, gdy widoczny jest drugi pęd boczny pierwszego rzędu (BBCH 14-22) lub w fazie rozwoju kwiatostanu (na pędzie głównym) do fazy, gdy pierwsze pąki kwiatowe są powiększone (BBCH 50-55).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Słonecznik zwyczajny (w uprawie na nasiona)

alternarioza słonecznika, plamistość łodyg słonecznika, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,9-1,0 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy, gdy rozwinięte są cztery liście (druga para) do końca fazy rozwoju liści (BBCH 14-19) lub od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy, gdy kwiatostan jest oddzielony od najmłodszych liści właściwych (BBCH 31-55).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Dynia zwyczajna (w uprawie wyłącznie na materiał siewny)

mączniak prawdziwy dyniowatych, alternarioza dyniowatych

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha

Etykieta środka ochrony roślin Saturion 325 SC

do użytku wewnętrznego, nie stanowi załącznika do zezwolenia MRiRW

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,9-1,0 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy rozwoju kwiatostanu do fazy, gdy na pędzie głównym otwarty jest 9. kwiat (BBCH 50-69).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

UWAGA: roślin dyni zwyczajnej (w tym nasion) chronionych środkiem nie należy przeznaczać do konsumpcji oraz na paszę dla zwierząt.

Len zwyczajny (w uprawie na włókno i w uprawie na materiał siewny)

mączniak prawdziwy lnu, rdza lnu

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,9-1,0 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy rozwiniętego czwartego liścia właściwego do końca fazy rozwoju liści (BBCH 14-19) lub od fazy wzrostu (wydłużania się) pędu głównego (pęd osiągnął 20% długości typowej dla odmiany) do fazy końca kwitnienia (widoczne ułożenie torebek nasiennych) (BBCH 32-69).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

UWAGA: roślin lnu (w tym nasion) chronionych środkiem nie należy przeznaczać do konsumpcji ani na paszę dla zwierząt oraz do wytwarzania oleju (z wyjątkiem produkcji na cele techniczne).

Konopie siewne (w uprawie na włókno i w uprawie na materiał siewny)

alternarioza konopi, fuzarioza konopi, septorioza konopi, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,9-1,0 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy rozwiniętej czwartej pary liści (liście złożone) do fazy, gdy widoczny jest zawiązek drugiego pędu bocznego (BBCH 14-22) lub od fazy, gdy główny pęd osiąga 10% ostatecznej długości do fazy końca kwitnienia (widoczne zawiązki owoców) (BBCH 31-69).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

UWAGA: roślin konopi siewnych (w tym nasion) chronionych środkiem nie należy przeznaczać do konsumpcji ani na paszę dla zwierząt oraz do wytwarzania oleju (z wyjątkiem produkcji na cele techniczne).

Brukiew (w uprawie na korzeń)

czern krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

*Etykieta środka ochrony roślin Saturion 325 SC
do użytku wewnętrznego, nie stanowi załącznika do zezwolenia MRiRW*

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,8-1,0 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku do końca fazy rozwoju części wegetatywnej rośliny przeznaczonej do zbioru (BBCH 39-49).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Cykoria korzeniowa

mączniak prawdziwy szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,8-1,0 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku do końca fazy rozwoju części wegetatywnej rośliny przeznaczonej do zbioru (BBCH 39-49).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Burak ćwikłowy (w uprawie na korzeń)

brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, rdza buraka, ryzoktoniozę korzeni

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,8-1,0 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku do końca fazy rozwoju części wegetatywnej rośliny przeznaczonej do zbioru (BBCH 39-49).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Chrzan pospolity

bielik krzyżowych, czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,8-1,0 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku do końca fazy rozwoju części wegetatywnej rośliny przeznaczonej do zbioru (BBCH 39-49).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

*Etykieta środka ochrony roślin Saturion 325 SC
do użytku wewnętrznego, nie stanowi załącznika do zezwolenia MRiRW*

Seler korzeniowy (w uprawie w polu)

alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, septorioza selera, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,8-1,0 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku do końca fazy rozwoju przeznaczonej do zbioru części wegetatywnej rośliny (BBCH 39-49).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rośliny szkółkarskie ozdobne, rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia oraz plantacje nasienne drzew leśnych

mączniaki prawdziwe, rdze, plamistość liści, antraknozy, osutka wiosenna sosny, czarna plamistość róży, choroby powodowane przez patogeny glebowe

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania: środek stosować wiosną, zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób w ochronie roślin szkółkarskich ozdobnych i roślin szkółkarskich leśnych do końca fazy wydłużania się, wzrostu i rozwoju pędów/rozety (BBCH 39), a w ochronie odnowień, zalesień i plantacji nasiennych drzew leśnych po fazie wydłużania się, wzrostu i rozwoju pędów (po BBCH 39).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 300-1200 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Wierzba sp. (uprawiana na cele energetyczne), wierzba sp. (uprawiana na cele wikliniarskie)

mączniaki prawdziwe, rdze, plamistość liści, Antraknoza, choroby powodowane przez patogeny glebowe

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: środek stosować wiosną, zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, po fazie wydłużania się i wybarwiania się pędów (po BBCH 39).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 300-1200 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Tytoń

brunatna sucha plamistość liści tytoniu (alternarioza tytoniu), mączniak prawdziwy tytoniu

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania: środek stosować, zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy, gdy pierwszy liść przeznaczony do zbioru jest w pełni rozwinięty i zaczyna dojrzewać (BBCH 40).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

*Etykieta środka ochrony roślin Saturion 325 SC
do użytku wewnętrznego, nie stanowi załącznika do zezwolenia MRiRW*

Zalecana ilość wody: 300-1200 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Po zastosowaniu tego środka w roślinach ozdobnych, szkółkach, zalesieniach, odnowieniach, roślinach energetycznych i tytoniu, środki zawierające substancję difenokonazol można zastosować na tym samym polu najwcześniej za 3 lata.

Po zastosowaniu tego środka w uprawie selera, chrzanu, buraka, cykorii, brukwi, konopi, lnu, dyni, słonecznika, soi, maku, gorczycy, rzepaku, środki zawierające substancję difenokonazol można zastosować na tym samym polu najwcześniej za 2 lata.

Przy ustalaniu wielkości kropel cieczy użytkowej należy uwzględnić ograniczenia wymienione w akapitach dotyczących środków ostrożności związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, przy czym szczególną ostrożność zachować w pobliżu sadów jabłoniowych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Środka nie zaleca się stosować do ochrony ozdobnych odmian jabłoni.

Środek zawiera dwie substancje czynne o różnym mechanizmie działania: difenokonazol, związek triazolowy należący do grupy inhibitorów syntezy steroli – inhibitorów demetylacji, SBI I - DMI (wg klasyfikacji FRAC grupa 3) i azoksystrobinę, z grupy fungicydów strobilurynowych – inhibitorów oddychania komórkowego - inhibitorów cytochromu bc1, QoI (wg klasyfikacji FRAC grupa 11). Wielokrotne stosowanie środka lub środków zawierających substancje czynne o takim samym mechanizmie działania może doprowadzić do zmniejszenia skuteczności działania środka. W ramach strategii przeciwdziałania rozwojowi odporności w populacjach sprawców chorób zaleca się m. in.:

- stosowanie środka głównie zapobiegawczo lub natychmiast przy wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych (tak wcześnie jak to możliwe w rozpoczętym cyklu chorobowym),
- stosowanie środka wyłącznie w zalecanych dawkach i nie częściej, niż jest to wskazane na etykiecie,
- włączenie do przyjętego programu ochrony środków grzybobójczych, zawierających substancje czynne z innych grup wg klasyfikacji FRAC, o odmiennych mechanizmach działania (stosowanie przemienne),
- stosowanie innych niż chemiczne metod ograniczania chorób, zgodnych z zaleceniami integrowanej ochrony np. uprawa odmian odpornych lub o mniejszej podatności, przestrzeganie zasad zmianowania i właściwej agrotechniki.

OKRESY KARENCJI

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Rzepak ozimy, rzepak jary, gorczyca biała (w uprawie na nasiona), soja (w uprawie na nasiona), słonecznik zwyczajny (w uprawie na nasiona), mak lekarski (w uprawie na nasiona) – 60 dni.

Burak cukrowy, cykoria korzeniowa, seler korzeniowy, chrzan pospolity, burak ćwikłowy (w uprawie na korzeń), brukiew (w uprawie na korzeń) – 35 dni.

Dynia zwyczajna (w uprawie wyłącznie na materiał siewny), len zwyczajny (w uprawie na włókno i w uprawie na materiał siewny), konopie siewne (w uprawie na włókno i w uprawie na materiał siewny), rośliny szkółkarskie ozdobne, rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia oraz plantacje nasienne drzew leśnych, wierzba sp. (uprawiana na cele energetyczne), wierzba sp. (uprawiana na cele wikliniarskie), tytoń – nie dotyczy.

*Etykieta środka ochrony roślin Saturion 325 SC
do użytku wewnętrznego, nie stanowi załącznika do zezwolenia MRiRW*

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następnie.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Opryskiwacze polowe/sadownicze

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz, postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wleciu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Opryskiwacze ręczne/plecakowe

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz, postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wleciu środka do zbiornika opryskiwacza, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w zbiorniku dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

- jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą podczas ręcznego zbioru plonów oraz w pracach w szkółkach roślin ozdobnych, szkółkach roślin leśnych, odnowieniach, zalesieniach oraz plantacjach nasiennych drzew leśnych, w uprawach wierzby na cele energetyczne, wierzby na cele wikliniarskie oraz tytoniu.

W szkółkach roślin ozdobnych, szkółkach roślin leśnych, odnowieniach, zalesieniach oraz plantacjach nasiennych drzew leśnych, w uprawach wierzby na cele energetyczne, wierzby na cele wikliniarskie oraz tytoniu stosować 5-m strefę ochronną.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczoł.

Następujące uprawy powyżej 50 cm wysokości - rośliny ozdobne, szkółki, zalesienia, odnowienia itp., rośliny energetyczne:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów, niebędących celem działania środka, konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:

- 1 m w przypadku zastosowania samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego,
- 3 m w przypadku zastosowania samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza sadowniczego.

Burak cukrowy, warzywa korzeniowe, soja, tytoń, dynia, rzepak ozimy, rzepak jary, mak, len, konopie, gorczyca, słonecznik oraz następujące uprawy poniżej 50 cm wysokości - rośliny ozdobne, szkółki, zalesienia, odnowienia itp., rośliny energetyczne:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka, konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

*Etykieta środka ochrony roślin Saturion 325 SC
do użytku wewnętrznego, nie stanowi załącznika do zezwolenia MRiRW*

Środek ochrony roślin przechowywać:

- pod zamknięciem,
- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania.

W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku narażenia lub styczości: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności – 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -